



**Fără concurență,
de la început!**

Citadel[®]

ERBICID

**Culturi curate fără iarba vântului
și buruieni cu frunza lată.**

- Erbicid cu aplicare toamna în postemergență.
- Efect foarte bun împotriva buruienii iarba vântului (*Apera spica-venti*).
- Spectru larg de combatere a buruienilor dicotiledonate.
- Rezolvă buruieni problemă din culturile de cereale păioase precum: *Veronica spp.*, *Galium aparine* sau *Papaver spp.*
- Omologat în culturile de grâu, orz de toamnă, triticale și seacă.

Efect de lungă durată împotriva buruienilor problemă din culturile de cereale păioase


Citadel®
ERBICID

Mod de acțiune

- Citadel® este un erbicid postemergent, selectiv pentru cereale păioase, cu aplicare în toamnă pentru combaterea buruienilor monocotiledonate și dicotiledonate anuale.
- Datorită efectului combinat al celor 3 substanțe active (**diflufenican, penoxsulam și florasulam**), Citadel® are acțiune atât la nivelul solului cât și la nivel foliar, având un efect foarte bun chiar și în condiții mai puțin favorabile.



Citadel® 2021 - Efecte după aplicarea în toamna 2020



Tehnologia de aplicare


- Citadel® se aplică **toamna**, în postemergență, la culturile de grâu și orz de toamnă, triticale, secară, în doză de **1.0 litru/ha**, începând cu faza de o frunză până la stadiul culturii tratate de 3 frați (BBCH 11-23), cu excepția culturii de secară, unde se aplică până la 3-4 frunze (BBCH 11-14), iar buruienile dicotile să nu depășească faza de 4 frunze.
- Se va aplica un singur tratament pe sezon, pe aceeași suprafață. Cantitatea de soluție recomandată: 200-300 litri/ha.
- Înainte de aplicarea produsului în cultura de secară de toamnă, se recomandă consultarea deținătorului autorizației cu privire la cât de sensibil este soiul de secară cultivat.
- Produsul Citadel® se aplică când temperatura aerului este cuprinsă între 5 și 25°C, pe plantele neatacate de boli și dăunători, neafectate de îngheț, secetă și umiditate excesivă.

Cultură calamitată


- În caz de cultură calamitată după un tratament în toamnă cu Citadel®, în primăvara următoare, se pot înființa următoarele culturi: porumb sau cereale de primăvară.

Rotația culturilor

- În cazul unei rotații normale, se pot înființa următoarele culturi: în toamna următoare, după recoltarea culturilor tratate cu Citadel®, se pot înființa: rapiță de toamnă, cereale de toamnă; în primăvara anului următor, după recoltarea culturilor tratate cu Citadel®, se poate înființa orice cultură.



- Aplicarea în toamnă a produsului Citadel® reduce competiția buruienilor cu plantele de cultură, pentru hrană și apă, încă din primele stadii de vegetație, asigurând un start mai bun al culturii de cereale și o trecere mai bună peste iarnă.
- Aplicarea din toamnă a erbicidului Citadel® oferă un spor de producție de aproximativ 10% (aprox. 600 kg/ha) și este de cele mai multe ori mai profitabilă comparativ cu erbicidarea de primăvară.








Principalele buruieni combătute de erbicidul Citadel® în culturile de cereale păioase

Citadel®

ERBICID

SPECTRU DE COMBATERE

Iarba vântului <i>Apera spica-venti</i>	++++
Specii de brassica <i>Brassica spp.</i>	++++
Traista ciobanului <i>Capsella bursa-pastoris</i>	++++
Albăstrea <i>Centaurea cyanus</i>	++++
Turiță <i>Galium aparine</i>	++++
Sugel <i>Lamium amplexicaule</i>	++++
Sugel <i>Lamium purpureum</i>	++++
Mac <i>Papaver spp.</i>	++++
Rocoină <i>Stellaria media</i>	++++
Punguliță <i>Thlaspi arvense</i>	++++
Urzică <i>Urtica urens</i>	++++
Veronica <i>Veronica hederifolia</i>	++++
Veronica <i>Veronica persica</i>	++++
Viorea de ogor <i>Viola arvensis</i>	++++

*Apera spica-venti**Stellaria media**Brassica spp.**Papaver spp.**Capsella bursa-pastoris**Thlaspi arvense**Centaurea cyanus**Urtica urens**Galium aparine**Veronica hederifolia**Lamium amplexicaule**Veronica persica**Lamium purpureum**Viola arvensis*