

UTRISHA N

Stimulator de creștere

Compoziția: *Methylobacterium symbioticum* (SB23) 3 x 10⁷ CFU/g

Formularea: Pulbere solubila în apă (SP)

Inregistrat in Republica Moldova in baza certificatului nr. F-0377 / 24.12.2022

Producător: Symborg Business Development S.L.U.
Avda. Jesus Martinez Cortado, 51. P.I. Cabezo Cortado,
30100, Murcia, Spania.

Deținătorul omologării:

Corteva Agriscience România SRL,
Sat Șindrilița, Comuna Gâneasa,
DN 2, KM. 19, Județ Ilfov, România
Tel: +40(0)31 620 4100, Fax: +40(0)31 620 4101

Distribuitori:

Corteva Crop Solutions ROM S.R.L

Șos. București-Ploiești, Nr. 42-44
Băneasa Business Technology Park
Clădirea B, Et. 2, 013696
București, Sector 1
Tel: +40(0)31 620 4100 (recepție)
Fax: +40(0)31 620 4101

CÎ AGROSTOC: Str. A. Mateevici 18/7, or. Strășeni, MD-3701; Tel.: 0 22 59 70 80
FPC BIOPROTECT SRL Bd. G. Vieru 2, or. Chișinău, MD 2005, Tel.: 0 22 214 110, 0 22 214 112
DIAZCHIM SRL Str. șos. Chișinău 16, or. Strășeni, MD 3701; Tel/fax: 0 22-79-12-20
VADALEX-AGRO SRL Str. L. Deleanu 7/6, or. Chișinău, MD 2071, Tel.: 0 22 605 949
GOLD CORN SRL or. Tiraspol, str. Sevchenko 92, Tel.: 069 967 087.
IMEXAGRO SRL MD-2004, mun. Chișinău, Moldova str. Columna,174, TEL./FAX: +373 (22) 75 27 01, +373 60 200 551

Ambulanță/Politie/Pompieri: Tel.112

Lot Nr: vezi pe ambalaj

Data fabricarii: vezi pe ambalaj

Data expirării: 2 ani valabilitate

Greutate netă: 0.333 kg, 1 kg, 3 kg and 10 kg

PENTRU A EVITA CONTAMINAREA MEDIULUI SI A UTILIZATORULUI, RESPECTATI INSTRUCȚIUNILE DE PE ETICHETĂ.

Eticheta produsului: nu este o substanță sau amestec periculoasă

Etichetare in conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1272/2008

Fraze de precauție:

- P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- P261: Evitați inhalarea prafului.
- P262: Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea.
- P264: Spălați-vă pe mâini după utilizarea produsului.
- P270: A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.
- P391: Colectați scurgerile de produs.
- P501: Eliminați conținutul/recipientul conform reglementărilor locale / naționale.
- P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.
- EUH401: PENTRU A EVITA RISCURILE PENTRU SĂNĂTATEA UMANĂ ȘI MEDIU, A SE RESPECTA INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE.

Informații de prim ajutor:

Instrucțiuni generale: Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Dacă nu vă simțiți bine sau aveți simptome de probleme de respirație, contactați un medic sau sunați la un centru de control toxicologic. Dacă este nevoie de asistență medicală, aveți la îndemână ambalajul sau eticheta produsului. Nu lăsați pacientul singur.	
În caz de inhalare:	Mutați victima la aer curat. Dacă încetează să respire, faceți respirație artificială. Sunați medicul.
În caz de contact cu pielea:	Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată. Spălați cu multă apă. Dacă apare iritația pielii, consultați un medic.
În caz de contact cu ochii:	În caz de contact cu ochii, clătiți cu atenție cu apă timp de câteva minute și țineți ochii larg deschiși. Scoateți lentilele de contact dacă sunt prezente și ușor de făcut. Continuați clătirea. Dacă iritația ochilor persistă, consultați un medic.
În caz de ingerare accidentală:	Clătiți gura cu apă. NU PROVOCAȚI voma. Sunați imediat un medic sau un centru de control toxicologic.

Recomandare terapeutică: tratament simptomatic

Conține microorganisme care pot crea reacții alergice. La manipularea preparatului sau la aplicarea produsului se recomandă utilizarea echipamentului de protecție respiratorie (respirator de unică folosință sau mască cu filtru, cel puțin EN 149 FFP3 sau echivalent).

MOD DE ACTIUNE:

Favorizează disponibilitatea nutritivă, absorbția și utilizarea azotului prin preluarea lui din atmosferă și fixarea lui în forma utilizabilă de planta de cultură. După aplicare, bacteriile prezente în produsul **UTRISHA N**, colonizează rapid părțile aeriene (vegetative) ale plantei, multiplicându-se pe parcursul ciclului de viață.

UTRISHA N favorizează absorbția azotului din atmosferă și îl fixează cu ajutorul proceselor simbiotice din plantă totodată favorizând procesele fotosintetice.

APLICAREA PRODUSULUI:

Recomandări

Utrisha N este destinat aplicării foliare.

Culturi	Doză de aplicare (g/ha)	Perioada de aplicare	Volum de apă l/ha
Culturi horticole			
Mangold (Beta vulgaris L. var cicla L), usturoi, anghinare, țelină, broccoli, ceapă, ceapă verde, varză, conopidă, andivă creată (Cichorium endivia var. crispum), sparanghel alb, sparanghel verde, spanac, mazăre, fasole, sfeclă de zahăr, fenicul, salată verde, pepene galben, praz, ridiche de lună, conopidă Romanesco, pepene verde (Citrullus lanatus) și morcov.	0.333 kg/ha	Se aplică din faza de 4 frunze (BBCH 14) și până la începutul înfloririi, când 10% din inflorescența de pe tulpina principală este deschisă (BBCH 61).	100–400
Cartof		Se aplică din faza de închidere a rândurilor (BBCH 25) și începutul înfloririi, când 10% din inflorescența de pe tulpina principală este deschisă (BBCH 61).	100–400
Căpșuni, afine, zmeură, mure, coacăze, merișoare		Se aplică din faza de 5 frunze complet apărute (BBCH 15) și până la începutul înfloririi, când 10% din flori sunt deschise (BBCH 61).	100–400
Vinete, dovlecei, castraveți, ardei, ardei pentru condimente și tomate.		Se aplică de la apariția primului lăstar lateral (BBCH 21) și până la începutul înfloririi, când prima floare de pe tulpina principală este deschisă (BBCH 61).	100–400
Culturi pe teren arabil			
Cereale de primăvară	0.333 kg/ha	Se aplică de la înfrățit (BBCH 25) și până la începutul înfloririi, când primele antere sunt vizibile. (BBCH 61).	100–250
Cereale de toamnă		Se aplică de la înfrățit (BBCH 25) și până la apariția celui de-al doilea internod (BBCH 32).	100–250
Rapiță de toamnă și de primăvară		Se aplică toamna, de la stadiul de 6-8 frunze BBCH 16-18 până la scăderea temperaturilor sub 10C noaptea iar primăvara de la stadiul de rozetă (BBCH 30) până la sfârșitul înfloritului (BBCH 69).	100–250
Orez		Se aplică de la stadiul de înfrățit (BBCH 25) și până la apariția celui de-al doilea internod (BBCH 32).	100–250
Bumbac		Se aplică de la faza în care butonii floralii sunt mari dar	300–800

		înca inchiși (BBCH 55) și până la stadiul în care 50% din flori sunt complet dezvoltate (BBCH 75).	
Floarea soarelui, porumb, soia, leguminoase și sorg		Se aplică între stadiul de 4 și 8 frunze complet desfăcute (BBCH 14–18)	100–250
Lucernă, pășuni		Se aplică între stadiul începutului creșterii (BBCH 21) și până la începutul înfloririi (BBCH 39).	100–250
Plante lemnoase			
Nuci & Pomi fructiferi	0,500 kg/ha	Se aplică de la începutul stadiului de creștere a lăstarilor (BBCH 31) și până la începutul înfloririi (BBCH 61).	500–2000
Măslini	0,333-0,500 kg/ha	Se aplică de la începutul stadiului de creștere a lăstarilor (BBCH 31) și până la începutul înfloririi (BBCH 61).	500–2000
Vița de vie	0,500 kg/ha	Se aplică de la apariția inflorescenței (BBCH 51) și până la începutul scuturării când 10% din flori au început să cadă (BBCH 61).	500–2000

RECOMANDĂRI ȘI PREPARAREA SOLUȚIEI: UTRISHA N se aplică dimineața la prima oră când stomatele sunt deschise la temperaturi între 10 și 30 °C. Plantele trebuie să fie în condiții optime de vegetație, fără stres nutritiv sau de altă natură.

Ph-ul soluției trebuie să fie între 5 și 8. Asigurați-vă că are un conținut de clor în amestec sub 2 ppm. Aplicați în maxim 6 ore de la prepararea soluției. În cazul în care ploaia survine la o oră de la aplicarea produsului este recomandată reaplicarea acestuia. Soluția preparată trebuie utilizată în decurs de maxim 6 ore de la momentul preparării acesteia.

Nu utilizați produsul:

- Pe plantele slăbite ca urmare a unei deficiențe de nutrienți, inclusiv de microelemente
- Pe plantele afectate de boli, dăunători, îngheț, secetă
- După gerurile nocturne și înainte de înghețurile prognozate
- Pe culturile deteriorate de salinitatea excesivă a solului.

CONDIȚII DE DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Păstrați produsul doar în ambalajul său original, închis ermetic, într-un spațiu conform normelor în vigoare, la distanță de alimente și băuturi, inclusiv hrană pentru animale.

A se păstra produsul ferit de lumina directă a soarelui, la temperatura camerei, într-un spațiu răcoros și aerisit. Nu îl expuneți la temperaturi sub 4°C sau peste 35°C.

Conține microorganisme care pot crea reacții alergice. Se recomandă folosirea de măști de protecție cu filtru sau model N99 în momentul preparării soluției sau a manipulării produsului.

MĂSURI DE PROTECȚIE Se va evita un contact prelungit sau repetat cu pielea. A se evita contactul cu ochii, pielea și hainele. Evitați inhalarea vaporilor sau a aburilor. Nu se va înghiți. Se vor spăla mâinile foarte temeinic după manipulare. Este recomandat să purtați mască de protecție cel puțin de tip N99 (EN 149 FFP3) sau echivalent, când manipulați produsul sau îl aplicați.

MANIPULAREA LICHIDELOR REZIDUALE ȘI CURĂȚAREA APARATULUI

Clățiți ambalajul gol de trei ori. Turnați soluția rămasă în rezervorul pulverizatorului. Ambalajele goale trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale.

Este interzisă reutilizarea recipientelor goale după prepararea soluției.

Resturile de produs și apă utilizate pentru curățarea ambalajelor și echipamentelor goale ar trebui să fie: eliminate în conformitate cu prevederile privind deșeurile.

Spălați bine aparatul imediat după lucru. Se recomandă clătirea rezervorului și a instalației pulverizatorului de două ori cu apă curată.

Nu contaminați apa potabilă cu produsul sau ambalajul acestuia.

Nu spălați echipamentul în apropierea apei de suprafață.

Evitați contaminarea apelor prin șanțuri de drenaj din ferme și drumuri.

Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată, mănuși și ochelari de protecție adecvate. Curățați rapid scurgerile. Clățiți zona contaminată cu multă apă.

Aruncați resturile în conformitate cu reglementările aplicabile.

AVERTIZĂRI: Recomandările și informațiile furnizate sunt rezultatul unor cercetări și testări ample și riguroase. Cu toate acestea, în utilizarea produsului pot apărea factori care nu pot fi controlați (prepararea amestecurilor, aplicarea, condițiile climatice etc.). Producătorul este responsabil pentru compoziție, formulă și conținut. Utilizatorul este responsabil pentru orice daune (ineficacitate, toxicitate generală, deșeurile etc.) cauzate de nerespectarea totală sau parțială a instrucțiunilor date pe etichetă.

Produsul a fost introdus în temeiul Ord. 6/2004 privind autorizarea îngrășămintelor pentru utilizarea și comercializarea în România.

Sunați la spital dacă va simțiți rău. Arătați cadrului medical eticheta produsului. Pentru informații medicale suplimentare - **număr internațional de urgență: +49 180 2273 - 112.**

IN ATENȚIA UTILIZATORULUI

Symborg garantează pentru calitatea produsului în următoarele condiții. Măsurile de utilizare au fost dezvoltate ca urmare a urmăririi cu rigurozitate a testelor în câmp și laborator. Cu toate acestea este imposibil de luat în considerare toate riscurile potențiale și eliminarea lor. Symborg nu poate fi considerat responsabil în cazul rănirii sau pierderilor survenite din cauza manipulării sau utilizării neconforme a produsului. Symborg garantează calitatea chimică a produsului conform etichetei. Orice modificare a etichetei se va face doar cu acceptul unui reprezentant Symborg autorizat în acest sens.

Producătorul asigură calitatea produsului doar dacă este păstrat și aplicat conform instrucțiunilor din această etichetă. Producătorul nu poate verifica depozitarea și utilizarea tocmai de aceea nu poate fi răspunzător pentru utilizarea neconformă.

